

Caso o paciente seja portador de alguma doença como: cardíaca, renal, pulmonar, diabetes ou fazer uso de medicações anticoagulantes é de extrema importância que a atendente seja informada com antecedência, pois ajudará a definir qual será a melhor forma de sedação para a realização do exame.

Não ingerir alimentos que contenham sementes e fibras 07 (sete) dias antes do exame (exemplo: pão integral, arroz integral, granola, chia, linhaça, verduras de folhas etc.) No dia anterior ao exame:

Obs: Caso o paciente faça uso de medicações anticoagulantes, favor entrar contato com seu cardiologista, antes de agendar o exame.

No dia anterior ao exame:

- Às 08h00min no café da manhã você poderá se alimentar de: bolacha água e sal, torradas, tomar chá de cores claras, sucos de cores claras coados, água de coco.
- Ingerir líquidos à vontade durante o dia : suco de cores claras e coados , chá de cores claras , água de coco, isotônicos , água etc. O líquido ajuda no funcionamento do intestino, quanto maior a quantidade de líquido ingerir melhor será o preparo.
- As 10h00min horas tomar 2(dois) comprimidos de DULCOLAX (laxante)
- O almoço deverá ser entre 12h00min e 13h00min horas alimentos permitidos: macarrão sem molho (miojo) ,batatas, ovos, carne moída,frango sem pele.
- Às 16 horas tomar 02 comprimidos de DULCOLAX(laxante).
- As 19:00 horas dissolver 01 sachê fosfatado de PROATIVA em um copo de água, misturar bem tomá-lo de um a vez.
- Após as 19 horas não comer nada só pode tomar líquidos de cor clara.
- Não pode comer nada.
- 04 horas antes do exame:dissolver 01 sachê fosfatado de PROATIVA em um copo de água, misturar bem tomá-lo de um a vez,
- A ingestão de água esta liberada até 4 (quatro) horas antes do exame.
- O exame não será realizado se o intestino não estiver totalmente limpo: sem resíduos sólidos e o líquido eliminado durante a evacuação de cor amarelo claro.

IMPORTANTE

Caso o intestino não limpe, favor entrar em contato com o setor de endoscopia (43) 3372-0049. Caso seja necessário realizar coleta de material (biopsia ou pólipos) ou algum procedimento terapêutico (dilatação, escleroterapia, etc) haverá acréscimo de valor ou liberação de guia.

A colonoscopia tem o objetivo de visualizar todo o interior do intestino grosso e detectar possíveis alterações. Para que o exame seja realizado com sucesso, é muito importante que o intestino esteja bem limpo. No paciente que será submetido a Colonoscopia será instalado um soro e administrado uma medicação sedativa (para dormir) pela veia.

O exame leva em média de 10 a 30 minutos. Após o exame, o paciente é levado para uma sala de recuperação onde permanecerá por mais uns 30 minutos para terminar de tomar o soro e se recuperar do efeito do sedativo.

O paciente só será liberado para ir embora quando estiver em boas condições. O paciente deve trazer um acompanhante maior de idade e não pode em hipótese alguma, dirigir ou trabalhar após o exame (o tempo estabelecido para poder dirigir é de no mínimo 4 horas após o exame).

Não é recomendado voltar de moto. Todas essas recomendações devem ser rigorosamente seguidas para evitar maiores transtornos, pois são feitas em função do medicamento sedativo que é utilizado e que deixa um efeito de sonolência, amnésia e retarda os reflexos motores. Favor não trazer

Preparo para Colonoscopia (Proativa)

objetos de valores e para as mulheres evitem vir para o exame com esmaltes de cores escuras isso dificulta a medição da oximetria durante o exame.