

Preparo para Manometria e PH Metria Esofágica

- Manter um período de jejum de seis a oito antes do exame. Em casos que o paciente seja portador de esôfago dilatado ou megaesôfago, o período de jejum deve ser estendido para doze horas
- Trazer exames relacionados ao esôfago já realizados anteriormente (raio-x do esôfago, endoscopia, pHmetria e cintilografia).
- Trazer guia para realizar o exame com a liberação do convênio.
- Trazer exames já realizados de outras especialidades que podem ajudar no caso de diagnóstico diferencial (eletrocardiograma, ecocardiograma, espirometria e videolaringoscopia)
- Suspende os medicamentos que contenham os seguintes componentes genéricos (ver na bula):
- Uma sonda e um aparelho registrador é colocado no paciente, ficando por um período aproximado de 24 horas, devendo o paciente vir para retirá-lo no dia seguinte, conforme orientação da enfermagem. ** somente no exame de PH Metria **

Suspender 24 horas antes do exame:

- Nitratos: Nitroglicerina; Dinitrato de Isorbida
- Bloqueadores dos canais de cálcio: Nifedipina; Verapamil; Diltiazem
- Procinéticos: Metoclopramida; Bromoprida; Cisaprida; Betanecol

Suspender uma semana antes do exame:

- Bloqueadores H2: Cimetidina; Ranitidina; Nizaditina; Famotidina
- Inibidores da bomba de prótons: Omeprazol; Lanzoprazol; Pantoprazol