

	PREPARO DE VIDEO NASOFARINGOLARINGOSCOPIA	CÓDIGO FQ-EX-29	VERSÃO 00
		VIGÊNCIA 11/01/2021	PÁGINAS 1/1

**Orientações gerais para a realização de exame
Endoscópico nasal sem sedação ou anestesia:**

- O jejum deverá ser de no mínimo de 2 (duas) horas para alimentos sólidos e líquidos. Para as pessoas com sensibilidade maior e que tenham muita náuseas (hiperemese) o jejum deverá ser de 4 horas;
- A refeição antes do exame deverá ser de características leves, não devendo consumir alimentos em demasia;
- Códigos usados parara liberação:
4.02.01.21-0 Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível
4.02.01.25-2 Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscópio flexível,
4.02.01.19-8 Vídeo-endoscopia do esfíncter velo-palatino com ótica flexível.
- As medicações em uso não deverão ser suspensa, somente respeitar o jejum solicitado. Favor notificar ao medico examinador as medicações em uso;
- Notificar as alergias a medicações que já são conhecidas pelo paciente.
PRINCIPALMENTE ANESTÉSICOS TOPICOS COMO A LIDOCAINA IODO TOPICO, CLORO, e outros;

Observações: O exame de Laringoscopia, ao contrário do que se possa imaginar, não é tão desconfortável ,A Laringoscopia consiste no exame das vias aéreas altas (nariz, faringe e laringe) por meio de um aparelho chamado fibroscópio, seu objetivo principal é auxiliar o seu médico no diagnóstico de afecções da porção alta das vias aéreas, duração : o exame de Laringoscopia, em regra, dura entre 5 a 10 minutos. Em virtude da anestesia local, a cliente deve ser liberado após 30 minutos **Alimentar-se levemente uma hora depois do exame**